



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 15 de noviembre de 2010 (B.O.C. nº 234 de 26/11/2010)

Categoría: **ODONTOESTOMATÓLOGOS/AS**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquema inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta .
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- Dentro de la estructura genética del VIH. ¿Qué gen es el encargado de codificar la síntesis de las enzimas transcriptasa inversa, proteasa e integrasa?
 - A) El gen gag.
 - B) El gen pol.
 - C) El gen env
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
- 2.- Que antiinflamatorio no hay que dar si el niño es menor de 6 años:
 - A) Ácido Niflúmico.
 - B) Aceclofenaco.
 - C) Diclofenaco.
 - D) Ibuprofeno.
- 3.- Las manifestaciones orales del diabético en relación a su enfermedad son todas MENOS:
 - A) Ardor bucal
 - B) Candidiasis
 - C) Enfermedad periodontal
 - D) Leucoplasia
- 4.- La dosis recomendada de profilaxis antibiótica para realizar una extracción de un molar con caries en un niño de 7 años de edad con alto riesgo por comunicación interventricular que pesa 20 Kg no siendo alérgico a ningún medicamento es :
 - A) 1 gr de amoxicilina 1 hora antes de la intervención.
 - B) 1 gr de amoxicilina 1 hora antes de la intervención continuando 500 mgr cada 8 horas durante 7 días.
 - C) 750 mgr de amoxicilina 1 hora antes de la intervención.
 - D) 750 mgr de amoxicilina 1 hora antes de la intervención continuando 375 mgr cada 8 horas durante 7 días.
- 5.- ¿Qué área del conocimiento se ocupa del estudio cuali-cuantitativo de la población en un momento determinado?:
 - A) Demografía dinámica
 - B) Demografía estática
 - C) Demografía estacional
 - D) Demografía ecológica
- 6.- Respecto a la hemofilia, señale lo incorrecto.
 - A) En la hemofilia A hay déficit de factor VIII.
 - B) La padecen fundamentalmente las mujeres.
 - C) El tiempo de hemorragia es normal.
 - D) El gen que codifica el factor IX se encuentra en el cromosoma X.
- 7.- De las siguientes cual NO es considerada una conducta disruptiva o entorpecedora del niño en la consulta
 - A) Mover la cabeza de un lado a otro
 - B) No querer entrar en la consulta
 - C) Dar manotazos
 - D) Cerrar la boca
- 8.- Cuando aparecen líneas blancas atravesando la superficie del diente en todas partes y en algunos casos puede verse un casquete blanco como "pico nevado" hablamos de:
 - A) Fluorosis leve.
 - B) Fluorosis moderada.
 - C) Fluorosis grave.
 - D) Hipoplasia de esmalte.

- 9.- La complicación más frecuente de la exodoncia es:
- A) Fractura de la aguja de anestesia
 - B) Deglución o aspiración de pieza extraída o fragmento óseo
 - C) Fractura dentaria
 - D) Hemorragia
- 10.- La profilaxis de la endocarditis bacteriana en niños alérgicos a la penicilina, la realizamos con:
- A) Azitromicina 50mg. / kg
 - B) Claritromicina 50mg. / kg
 - C) Cefalexina 10mg. / kg
 - D) Clindamicina 20mg. /kg
- 11.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa acerca de los selladores de fisuras:
- A) Obtienen su máximo beneficio clínico en las superficies oclusales de los molares permanentes.
 - B) Está indicado en pacientes con riesgo intermedio o alto de caries.
 - C) La pasta abrasiva previa a su colocación debe contener flúor.
 - D) De un correcto lavado y secado va a depender la adecuada o no unión del sellador al diente preparado.
- 12.- El diente retenido que ha perforado el techo óseo, con apertura del saco pericoronario o no y que puede hacer su aparición en boca o permanecer en situación submucosa se dice que está en:
- A) Retención.
 - B) Inclusión.
 - C) Enclavamiento.
 - D) Impactación
- 13.- Respecto al PADICAN, señale la opción falsa:
- A) Es el programa de atención dental infantil de canarias
 - B) Se dirige a la población de 3 a 15 años
 - C) Hasta ahora ha estado subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad y por el Gobierno de Canarias
 - D) Todos los anteriores
- 14.- Entre las complicaciones de una infección pulpo-periapical pueden estar:
- A) Osteomielitis
 - B) Absceso
 - C) Celulitis.
 - D) Todo lo anterior.
- 15.- El tumor odontogénico en el que están representados todos los tejidos dentarios, con un patrón ordenado, de tal forma que la lesión consiste en múltiples estructuras similares al diente se denomina:
- A) Odontoma.
 - B) Odontoma compuesto.
 - C) Odontoma complejo
 - D) Tumor de Pindborg.
- 16.- El nivel óptimo de flúor en el agua de abastecimiento público para prevenir la caries es de:
- A) 0,3-0,5 partes por millón (ppm).
 - B) 0,5 a 0,7 ppm.
 - C) 0,7 a 1,5 ppm.
 - D) > 1,5 ppm.

- 17.- La Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente no menciona:
- A) El derecho a la información asistencial.
 - B) El derecho a la intimidad.
 - C) Los contenidos imprescindibles de una prescripción de prótesis
 - D) Todas son mencionadas por la Ley 41/2002.
- 18.- El indicador más utilizado para medir el nivel de salud de una población es:
- A) Mortalidad
 - B) Morbilidad diagnosticada
 - C) Morbilidad percibida
 - D) Calidad de vida
- 19.- Respecto a los torus palatinos y mandibulares, señale la opción FALSA:
- A) Son exóstosis óseas
 - B) Presentan una densa cortical y escaso hueso esponjoso
 - C) Su exéresis está siempre indicada
 - D) Están recubiertos de una mucosa delgada y poco irrigada que se ulcera con cierta facilidad
- 20.- Entre los posibles tratamientos de la neuralgia del trigémino NO se incluye
- A) Carbamazepina
 - B) Gabapentina
 - C) Descompresión quirúrgica del nervio
 - D) Ibuprofeno
- 21.- Entre los tratamientos preventivos que el Servicio Canario de Salud presta a las embarazadas, no está:
- A) Exodoncia
 - B) Tartrectomía
 - C) Obturaciones
 - D) Aplicación de flúor tópico
- 22.- ¿Cual de los siguientes procesos de esterilización permite esterilizar turbinas y contraángulos en clínica?
- A) Vapor químico. Chemiclave
 - B) Calor seco
 - C) Vapor a presión. Autoclave
 - D) Óxido de etileno
- 23.- Que analgésico se debe dar en pacientes hipertensos, ya que no altera la eficacia de los agentes antihipertensivos:
- A) Ibuprofeno.
 - B) Indometacina.
 - C) Naproxeno.
 - D) Paracetamol.
- 24.- Cual de estos factores no es diagnóstico de alto riesgo de caries:
- A) Elevado número de caries.
 - B) Altos índices de placa y gingivales.
 - C) Aparatología de ortodoncia y prótesis.
 - D) Obturaciones en buen estado.

- 25.- Para verificar la hipótesis epidemiológica se tendrá en cuenta:
- A) Reproducción del estudio
 - B) Exactitud
 - C) Validez de la información
 - D) Todas son correctas
- 26.- La medida de frecuencia que indica una probabilidad individual de enfermar es:
- A) Incidencia acumulada
 - B) Riesgo relativo
 - C) Densidad de incidencia
 - D) Prevalencia
- 27.- El síntoma patognomónico de periodontitis apical es:
- A) Dolor intermitente
 - B) Sensibilidad al calor
 - C) Dolor a la percusión del diente
 - D) Aumento del volumen extrabucal
- 28.- A nivel odontológico, señale lo incorrecto respecto a los antihipertensivos.
- A) Los diuréticos pueden provocar xeroftomía.
 - B) Los inhibidores adrenérgicos pueden producir hiperplasia gingival.
 - C) Los IECA pueden producir reacciones liquenoides.
 - D) Los antagonistas del calcio pueden producir hiperplasia gingival
- 29.- La prevención primaria pretende:
- A) Disminuir la prevalencia
 - B) Disminuir la incidencia
 - C) Disminuir la tasa de morbilidad
 - D) Disminuir la tasa de mortalidad
- 30.- Que actitud se debe tomar en pacientes trasplantados cardíacos. Señale la afirmación correcta:
- A) Son pacientes considerados de riesgo de endocarditis bacteriana susceptibles de profilaxis antibiótica.
 - B) Se debe administrar profilaxis antibiótica solo los primeros 6 meses después del trasplante.
 - C) Se debe administrar profilaxis antibiótica en pacientes trasplantados cardíacos con valvulopatías.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
- 31.- Entre las causas que originan un diastema interincisivo, se encuentran:
- A) Acromegalia
 - B) Mesiodens
 - C) Microdoncia
 - D) Todas las anteriores
- 32.- Respecto a la información microbiológica, señale la falsa:
- A) La notificación será de los casos confirmados que cumplan con criterios de infección reciente.
 - B) La información microbiológica debe permitir la caracterización de brotes epidémicos.
 - C) Los órganos competentes de la Administración Estatal seleccionaran los laboratorios que han de incorporarse al sistema.
 - D) La designación de un laboratorio como laboratorio de referencia implica su incorporación inmediata al sistema de información microbiológica.

- 33.- El tiempo necesario de un medicamento desde su aprobación en España para ser genérico es:
- A) 5 años.
 - B) 7 años.
 - C) 10 años.
 - D) 15 años.
- 34.- Uno de los siguientes datos no se encuentra en la neuralgia esencial del trigémino
- A) Dolor intenso paroxístico en localización dependiendo de la rama afectada.
 - B) Manifestaciones vegetativas.
 - C) Manifestaciones motoras faciales involuntarias.
 - D) Abolición del reflejo corneal
- 35.- Entre los indicadores medioambientales se encuentran:
- A) Centros de salud disponibles
 - B) Nivel de ruidos
 - C) Nivel de estudios
 - D) Calidad asistencial
- 36.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte:
- A) Eléctrico
 - B) Virtual
 - C) Físico
 - D) Plástico
- 37.- Una imagen radiopaca asociada a la raíz del 45, con márgenes bien definidos, descubierta en una exploración de rutina y con signos de vitalidad positivo , nos haría sospechar, en primer lugar:
- A) Cementoma
 - B) Síndrome de Gorlin
 - C) Ameloblastoma
 - D) Mixoma odontogénico
- 38.- La puesta en marcha de las medidas de prevención de la enfermedad se incluye en la etapa:
- A) Descriptiva
 - B) Experimental
 - C) Analítica
 - D) Resolutiva
- 39.- El analgésico de elección en el embarazo es:
- A) Aspirina
 - B) Paracetamol
 - C) Meperidina
 - D) Ibuprofeno
- 40.- Cual de los siguientes factores no se considera de importancia en la etiopatogenia de la caries dental:
- A) Edad.
 - B) Sexo
 - C) Características del agua de bebida.
 - D) Estructura dentaria.

- 41.- Los dientes prioritarios a la hora de colocar los selladores a los 6-8 años de edad son en un paciente con alto riesgo de caries:
- A) Primeros molares temporales.
 - B) Segundos molares temporales.
 - C) Primeros molares definitivos.
 - D) Cara lingual de incisivos laterales.
- 42.- Cual de estos factores no es considerado factor de predisponente a desarrollar la enfermedad periodontal:
- A) Tabaco
 - B) Alcohol
 - C) Stress
 - D) Diabetes insulino dependiente.
- 43.- Si un nuevo tratamiento aumenta la supervivencia de los enfermos que padecen un cáncer oral y las tasas de incidencia permanecen constantes, la prevalencia de dicho cáncer:
- A) No se modificará
 - B) Disminuirá
 - C) Aumentará
 - D) Dependerá de la tasa de ataque
- 44.- En cierta comunidad, el número total de mujeres dividido por el total de la población es igual a 0.8. Dicha medida:
- A) Es una tasa
 - B) Es una razón
 - C) Es una proporción
 - D) Es un porcentaje
- 45.- En general, NO está indicado en un niño de 13 años:
- A) Aplicación de fluor tópico
 - B) Mantenedor de espacio
 - C) Apicoformación del 27
 - D) Endodoncia del 11
- 46.- Los diseños epidemiológicos, según el momento de comienzo, son:
- A) Ambispectivos
 - B) Experimentales
 - C) Observacionales
 - D) Todas son correctas
- 47.- Conforme a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:
- A) Todos los profesionales deben tener acceso a toda la Historia Clínica.
 - B) La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida
 - C) Todo el personal tiene derecho a conocer los datos de salud de la Historia Clínica.
 - D) Todo el personal tiene derecho de acceso a toda la Historia Clínica, si así se establece en la legislación vigente.

- 48.- Una calcificación bien delimitada, que se presenta en el seno de una pulpa normal, es decir, en un diente sano, tanto clínica como histológicamente se denomina:
- A) Cálculo pulpar
 - B) Degeneración cálcica
 - C) Dentículo pulpar
 - D) Parodontolito
- 49.- Entre las medidas a considerar en la luxación intrusiva de un diente permanente no se recomienda:
- A) Recolocación quirúrgica con fórceps.
 - B) Reerupción espontánea
 - C) Tracción ortodóncica.
 - D) Tratamiento pulpar
- 50.- La falta de espacio en la arcada inferior tras la pérdida prematura de un 2º molar temporal provoca que el 2º premolar erupcione con mayor frecuencia hacia:
- A) Lingual
 - B) Vestibular
 - C) No hay erupción
 - D) Ninguna de las anteriores
- 51.-Cuál de los siguientes es útil para el estudio de la fase plaquetaria:
- A) Tiempo de hemorragia
 - B) Tiempo de coagulación
 - C) INR
 - D) Tiempo de protrombina
- 52.- ¿Qué tipo de células diferenciadas podemos encontrar en la pulpa dentaria?
- A) Fibroblastos.
 - B) Macrófagos.
 - C) Histiocitos.
 - D) Odontoblastos.
- 53.- Para el diagnóstico de los factores de riesgo de la caries, nos puede ayudar:
- A) Recogida de datos mediante historia
 - B) Exploración odontológica
 - C) Pruebas de susceptibilidad a la caries
 - D) Todas las anteriores
- 54.- La observancia del tratamiento prescrito:
- A) Es un deber que nunca podrán rechazar los usuarios pacientes.
 - B) Es un deber, pero el paciente podrá rechazar las actuaciones sanitarias, debiendo para ello firmar el documento de Alta Voluntaria
 - C) Es un deber, pero el paciente, para poder rechazar las actuaciones sanitarias, deberá obtener autorización de la dirección del Servicio.
 - D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
- 55.- En estas situaciones hay más riesgo de caries dental, menos en una ¿Cuál?:
- A) Pacientes radiados de cabeza y cuello.
 - B) Paciente con medicación antidepresiva.
 - C) Enfermedades autoinmunes como Síndrome de Sjögren.
 - D) Pacientes con esclerodermia.

- 56.- La hipercalcificación tubular es sinónimo de:
- A) Dentina esclerótica.
 - B) Dentina transparente.
 - C) Todas las anteriores.
 - D) Dentina translúcida.
- 57.- La laceración se considera una lesión del:
- A) Hueso de soporte.
 - B) Los tejidos duros dentarios y pulpa.
 - C) Los tejidos periodontales.
 - D) Lesiones de la encía y mucosa oral.
- 58.- No está indicada la profilaxis de la endocarditis bacteriana en
- A) Prolapso mitral con insuficiencia mitral
 - B) Comunicación interauricular
 - C) Prótesis valvulares
 - D) Shunts quirúrgicos sistémico-pulmonares
- 59.- ¿Que actividades forman parte de un programa de salud?
- A) Actividades de prevención y diagnóstico precoz
 - B) Actividades de información y educación sanitaria
 - C) Ambas son ciertas
 - D) Ninguna es cierta
- 60.- Un niño de 7 años y 10 meses acude a consulta acompañado por su madre quien refiere que el niño tiene mucho dolor en una muela de abajo cuando toma cosas frías o calientes y a veces le empieza a doler sin tomar o comer nada. En el examen clínico el 46 tiene una caries oclusal profunda. En el examen radiográfico tiene pérdida de sustancia con involucración de cuerno mesial y delgada capa de dentina sana que recubre la cámara pulpar. Indique cual sería el tratamiento correcto:
- A) Remoción de la caries y protección pulpar directa.
 - B) Remoción de la caries y protección pulpar indirecta.
 - C) Remoción de la caries y pulpotomía.
 - D) Remoción de la caries y tratamiento de conductos.
- 61.- Cuando "todo" el molar superior ocluye por vestibular del inferior se denomina
- A) Mordida cruzada posterior
 - B) Mordida cruzada lateral
 - C) Mordida en tijera
 - D) Mordida en tijera invertida
- 62.- En la neuralgia esencial del glossofaríngeo, señale la opción incorrecta:
- A) Es mucho menos frecuente que las de trigémino
 - B) El dolor está localizado en la amígdala, en base lingual, en la pared lateral faríngea o en el oído.
 - C) Es agudo, intenso, dura segundos y desaparece
 - D) No tiene factores desencadenantes.
- 63.- Si un programa de Salud Bucodental para jóvenes tiene poca acogida, porque el horario coincide con el escolar, estamos ante un problema de:
- A) Eficiencia
 - B) Eficacia
 - C) Accesibilidad
 - D) Ninguna es cierta

- 64.- ¿Cuál de estas características no es cierta en la neuralgia esencial típica del Trigémino?:
- A) Dolor quemante.
 - B) No dolor intercrisis.
 - C) Unilateral.
 - D) Duración: minutos/ segundos
- 65.- ¿ Qué problemas puede presentar un paciente tratado con esteroides?
- A) Aumento de hemorragia
 - B) Aumento de susceptibilidad a la infección.
 - C) Aumento de la posibilidad de una crisis suprarrenal.
 - D) B y C son ciertas.
- 66.- La exodoncia de un diente unirradicular requiere:
- A) Sindesmotomía.
 - B) Lateralización.
 - C) Rotación
 - D) Todo lo anterior.
- 67.- El tratamiento de la estomatitis aftosa recidivante es:
- A) Anestésicos locales
 - B) Clorhexidina al 0,12%
 - C) Esteroides en orabase
 - D) Todas son correctas
- 68.-Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en lo que respecta a los traumatismos dentarios:
- A) En la fractura radicular el diente clínicamente puede aparecer elongado.
 - B) En la luxación extrusiva, la ferulización se colocará durante 1 ó 2 semanas.
 - C) En la infracción no hay pérdida de tejido dentario.
 - D) La luxación intrusiva es el tipo de traumatismo con pronóstico más favorable.
- 69.- ¿Cuál de los siguientes es un pseudoquiste?
- A) Quiste nasoalveolar
 - B) Quiste globulomaxilar
 - C) Quiste óseo traumático
 - D) Quiste del conducto nasopalatino
- 70.- La proporción de personas sanas de entre las que tuvieron test negativo, se conoce como:
- A) Especificidad.
 - B) Sensibilidad.
 - C) Valor predictivo positivo.
 - D) Valor predictivo negativo.
- 71.- El grado de polimerización de los composites no depende de:
- A) La intensidad de la luz.
 - B) El grosor de la capa de composite.
 - C) La contracción de polimerización
 - D) La distancia al foco luminoso
- 72.- ¿En qué tipo de programas preventivos comunitarios se aplica la planificación estratégica?
- A) En programas a medio plazo
 - B) En programas a largo plazo
 - C) En programas a corto plazo
 - D) Ninguna de las anteriores

- 73.- En general, respecto al tratamiento de una fractura de un incisivo central superior en un niño de 13 años, no nos planteamos realizar:
- A) Endodoncia
 - B) Apicoformación
 - C) Exodoncia
 - D) Obturación
- 74.- La neuralgia post herpética es más frecuente en
- A) Ancianos
 - B) Adolescentes
 - C) Recién nacidos
 - D) Lactantes
- 75.- De las siguientes pruebas, ¿cuál no utiliza antígenos treponémicos?
- A) FTA
 - B) TPI
 - C) VDRL
 - D) TPHA
- 76.- El tratamiento de un carcinoma espinocelular ya diagnosticado en el suelo de la boca en un paciente que acude a nuestra consulta es:
- A) Una actividad de prevención primaria.
 - B) Una actividad de prevención secundaria.
 - C) Una actividad de prevención terciaria.
 - D) Una actividad de prevención cuaternaria.
- 77.- En el cepillado dental, cual de estas afirmaciones es incorrecta:
- A) El cepillo blando es el más adecuado en odontología infantil.
 - B) Los cepillo eléctricos están recomendados para pacientes con poca destreza manual para manipular el cepillo.
 - C) El cepillado más importante es el de mediodía.
 - D) A eficacia del cepillo se mantiene hasta que su desgaste es muy avanzado.
- 78.- Respecto al tratamiento odontológico del paciente en diálisis:
- A) El mejor momento para tratarlo es un día después de la diálisis
 - B) El mejor momento para tratarlo es justo al acabar la sesión de diálisis
 - C) No se debe tratar
 - D) Ninguna de las anteriores
- 79.- No es un derecho reconocido en el Sistema Canario de la Salud:
- A) Disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos.
 - B) Revocar por escrito un consentimiento previo.
 - C) Programas y actuaciones especiales y preferentes.
 - D) Todos son derechos reconocidos.
- 80.- La población de hecho de una comunidad está formada por:
- A) Residentes presentes + residentes ausentes
 - B) Residentes ausentes + transeúntes
 - C) Residentes presentes + transeúntes
 - D) Ninguna es cierta

- 81.- En la amelogénesis imperfecta tipo hipocalcificada, señale la respuesta incorrecta:
- A) Es la forma más frecuente de presentación
 - B) La displasia se manifiesta como un problema cualitativo, y no de cantidad de esmalte
 - C) La alteración se presenta en la fase de morfodiferenciación del desarrollo dentario
 - D) Es frecuente la coexistencia de mordida abierta anterior
- 82.- La técnica de control de conducta que se utiliza en niños ligeramente retrasados es:
- A) Técnica de enfoque físico
 - B) Técnica de desensibilización
 - C) Técnica de modelamiento
 - D) Técnica de control de voz
- 83.- Para evaluar la eficiencia de un programa de salud bucodental se utilizan los análisis:
- A) Coste-eficacia
 - B) Coste-efectividad
 - C) Coste-beneficio
 - D) B y C
- 84.- ¿Cómo se denomina en epidemiología al grado en que un agente infeccioso puede causar problemas sanitarios importantes?
- A) Virulencia
 - B) Infectividad
 - C) Patogenicidad
 - D) Contagiosidad
- 85.- Al realizar la sutura después de extracciones múltiples para una prótesis completa inmediata tendremos en cuenta:
- A) Es indispensable atar a tensión las suturas
 - B) Se deben juntar los bordes cruentos de los colgajos vestibular y lingual o palatino
 - C) Es necesario hacer la primera sutura en la línea media
 - D) Todas son correctas
- 86.- Las causas que pueden convertir una exodoncia convencional en una exodoncia compleja son:
- A) Por enfermedad del paciente.
 - B) Por falta de cooperación
 - C) Por alteraciones locales.
 - D) Todas las anteriores.
- 87.- Las dimensiones de la calidad fueron descritas por:
- A) Freud
 - B) Martin Zurro
 - C) Donabedian y Vuori
 - D) Ninguno de los anteriores
- 88.- La incidencia de metástasis ganglionares es más frecuente en los tumores de glándula:
- A) Parótida.
 - B) Sublingual.
 - C) Glándulas salivales menores.
 - D) Glándulas salivales ectópicas

- 89.- Si una muestra es asimétrica, el mejor estadístico de centralización es:
- A) Mediana
 - B) Moda
 - C) Media ponderada
 - D) Media aritmética
- 90.-Cuál de las siguientes características es típica de pulpitis irreversible:
- A) Dolor no espontáneo, que desaparece al cesar el estímulo
 - B) El frío alivia la sintomatología.
 - C) Ausencia de exposición pulpar.
 - D) Ninguna es correcta.
- 91.- Entre los principales factores de mala oclusión en pacientes discapacitados psíquicos, se incluyen:
- A) Succión digital
 - B) Respiración oral
 - C) Malformaciones congénitas
 - D) Todas son correctas
- 92.- En determinadas circunstancias clínicas se recomienda realizar un enfoque familiar. Señale la respuesta incorrecta
- A) Problemas con salud mental.
 - B) Incumplimiento prescripción.
 - C) Problemas de adicción.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
- 93.- En relación con el paciente trasplantado:
- A) Puede aparecer hiperplasia gingival en los pacientes tratados con ciclosporina
 - B) El tratamiento de la patología bucodental de estos pacientes suele ser fundamentalmente paliativo y local.
 - C) Es importante la eliminación de la placa y el cálculo supra y subgingival, junto con una rigurosa higiene bucal por parte del paciente.
 - D) Todas son correctas
- 94.- Según las directrices del programa de salud oral en atención primaria a la hora de la aplicación profesional de barniz de flúor, señale la falsa :
- A) Está preferentemente indicada entre 3 y 5 años.
 - B) Puede aplicarse de 2 a 4 veces al año.
 - C) No hay riesgo de fluorosis.
 - D) Las piezas dentales en las que se aplica son incisivos y caninos.
- 95.- ¿En qué tipo de planificación sanitaria se identifican obstáculos y precede y acompaña nuestras actividades (metas)?
- A) Planificación normativa
 - B) Planificación estratégica
 - C) Planificación táctica y operacional
 - D) Ninguna de las anteriores
- 96.- ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO está comunmente asociada a infección por VIH?:
- A) Candidiasis
 - B) Leucoplasia vellosa
 - C) Pénfigo
 - D) Eritema gingival lineal

- 97.- La composición química de la fase orgánica de las resinas compuestas es:
- A) BIS-GMAS y dimetacrilatos de metano
 - B) Cristales de cuarzo.
 - C) Sílice.
 - D) Fibras cerámicas.
- 98.- La principal bacteria responsable de la progresión de caries en el ser humano es:
- A) Lactobacilos
 - B) Streptococo salivarius
 - C) Streptococo sanguis
 - D) Veionella
- 99.- El concepto de idoneidad, al evaluar un programa de salud bucodental, hace referencia a:
- A) La estructura de recursos
 - B) Los objetivos
 - C) Las actividades
 - D) Todas las anteriores
- 100.- Si un paciente decide negarse a recibir tratamiento (señale la respuesta incorrecta):
- A) Dicha negativa constará por escrito.
 - B) Prima el deber del médico sobre el derecho del paciente.
 - C) Tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley.
 - D) Todas son correctas.
- 101.- En la sedación ligera, ¿qué fármaco se utiliza de primera elección?
- A) Ansiolíticos
 - B) Hipnóticos
 - C) Narcóticos
 - D) Óxido nitroso
- 102.- La neuralgia del trigémino postherpética afecta con más frecuencia al territorio del:
- A) Nervio oftálmico de Willis
 - B) Nervio maxilar superior.
 - C) Nervio maxilar inferior.
 - D) Ganglio semilunar de Passer.
- 103.- Cual de estas afirmaciones es falsa:
- A) Los alimentos de mayor riesgo de caries son alimentos ricos en sacarosa.
 - B) La placa bacteriana se puede teñir.
 - C) La ausencia de hábitos higiénicos que tiendan a la remoción de placa bacteriana será considerable un factor de riesgo de caries dental.
 - D) El flúor no es considerado un agente carioprofiláctico.
- 104.- De las siguientes fuentes de datos, cual es la más relevante en la planificación de un programa de salud oral
- A) Encuestas epidemiológicas de morbilidad
 - B) Registro de enfermedades de declaración obligatoria
 - C) Registros de enfermedades crónicas
 - D) Registros de mortalidad

- 105.-** ¿Cuál de los siguientes es el estudio de elección para analizar la eficacia de una nueva prueba diagnóstica?
- A) Transversal
 - B) Ensayo clínico aleatorio
 - C) Serie de casos clínicos
 - D) Cohortes
- 106.-** La alveolectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en:
- A) Extirpación del hueso alveolar
 - B) Cierre de una abertura bucoantral
 - C) Reconstrucción del hueso alveolar
 - D) Reconstrucción de tejidos blandos
- 107.-** No es característico de la neuralgia del trigémino
- A) Dolor de escasa duración
 - B) Dolor de comienzo brusco
 - C) Dolor precipitado por contacto con zonas gatillo
 - D) Dolor acompañado de déficit neurológico
- 108.-** Una de las técnicas se lleva a cabo en la fase exploratoria de la entrevista clínica, señálela:
- A) Establecimiento de la relación.
 - B) Transmitir la opinión sobre lo que debe hacerse.
 - C) Compartir con el paciente un plan de actuación.
 - D) Verificar la comprensión de las instrucciones proporcionadas.
- 109.-** Desde que programas se realizan actividades de educación para la salud en Canarias:
- A) Aulas de salud y cepillin-cepillan
 - B) Únicamente desde aulas de salud
 - C) Sonrisas y sonrisitas
 - D) Ninguna de las anteriores
- 110.-** ¿Cómo se denomina a la relación entre disponibilidad del servicio sanitario y necesidades de la población atendida?
- A) Accesibilidad
 - B) Efectividad
 - C) Eficacia
 - D) Adecuación
- 111.-** El grado en que pueden reproducirse los resultados obtenidos por un procedimiento de medida se denomina:
- A) Sensibilidad
 - B) Especificidad
 - C) Fiabilidad
 - D) Validez
- 112.-** Cual de estas afirmaciones no es correcta de los selladores de fisura:
- A) Es un procedimiento preventivo de la caries, siempre y cuando se apliquen con diligencia y en el caso adecuado.
 - B) Deben colocarse en pacientes con riesgo intermedio o alto de caries.
 - C) Es considerada una medida preventiva no invasiva.
 - D) El éxito de los selladores depende directamente de la unión a la dentina.

- 113.- El tumor de embarazo se suele corresponder con:
- A) Queratoacantoma
 - B) Fibroma
 - C) Granuloma piógeno
 - D) Lipoma
- 114.- Se llama prevalencia a:
- A) Número de casos nuevos que surgen en una población en un determinado periodo de tiempo.
 - B) Proporción de personas de una población que padecerá una enfermedad a lo largo de un periodo de tiempo.
 - C) Número de casos (tanto antiguos como recientes) de una determinada enfermedad que existe en una población.
 - D) Seguimiento de cada uno de los miembros de una población.
- 115.- La prueba de Screening más utilizada en el diagnóstico de la infección por el VIH, es:
- A) Weestern-blot
 - B) Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
 - C) Técnica inmunoenzimática (EIA)
 - D) Radioinmunoprecipitación (RIPA)
- 116.- En el índice de necesidades de tratamiento priodontal CPITN, la existencia de sangrado a la exploración debe marcarse con el código:
- A) 0
 - B) 1
 - C) 2
 - D) 3
- 117.- Un estudio en el que los participantes se asignan al azar para recibir un nuevo tratamiento o un placebo, se denomina:
- A) Cohortes
 - B) Casos y controles
 - C) Ensayo clínico
 - D) Transversal
- 118.- La capacidad de instalación de un agente infeccioso en un organismo produciendo o no enfermedad se denomina:
- A) Infectividad
 - B) Contagiosidad
 - C) Virulencia
 - D) Patogenicidad
- 119.- ¿Cuál es el determinante que más influye en el estado de salud?
- A) La biología
 - B) La genética
 - C) Estilo de vida
 - D) Medio ambiente
- 120.- Entre las múltiples ventajas de las prótesis inmediatas, NO se encuentra:
- A) Hemostasia más correcta
 - B) Mayor reabsorción ósea
 - C) Se conserva la dimensión vertical
 - D) Curación más rápida

- 121.- ¿Cuál de los siguientes quistes tiene una localización extraósea?
- A) Quiste del conducto nasopalatino.
 - B) Quiste nasolabial.
 - C) Quiste medianopalatino
 - D) Quiste glóbulomaxilar.
- 122.- ¿Cuál de los siguientes indicadores es el más útil para valorar la extensión de una enfermedad crónica en una población?
- A) Incidencia acumulada.
 - B) Prevalencia
 - C) Tasa bruta de mortalidad
 - D) Razón de mortalidad estandarizada
- 123.- Entre las finalidades del desbridamiento quirúrgico de un absceso, están:
- A) Crear un medio desfavorable para los gérmenes anaerobios
 - B) Disminuir la cantidad de gérmenes patógenos
 - C) Disminución del dolor
 - D) Todas las anteriores
- 124.- La maniobra de Heimlich la empleamos en caso de:
- A) Hemorragia
 - B) Parada cardíaca
 - C) Atragantamiento
 - D) Parada respiratoria
- 125.- ¿Cuál de las siguientes lesiones maligniza con más frecuencia?
- A) Pénfigo
 - B) Leucoplasia homogénea
 - C) Queilitis actínica
 - D) Eritroplasia
- 126.- Una lengua vellosa negra se debe a:
- A) Afectación de las papilas fungiformes
 - B) Afectación de las papilas filiformes
 - C) Afectación de las papilas caliciformes
 - D) Cambio de color de la colonia de *Cándida Albicans*
- 127.- El Excerpta Médica es:
- A) Una asociación médica.
 - B) Una base de datos.
 - C) Una revista científica.
 - D) Todas son falsas
- 128.- Se debe tener precaución con el uso de vasoconstrictores en los hipertensos en tratamiento con:
- A) Diuréticos
 - B) Inhibidores del calcio
 - C) Betabloqueantes
 - D) IECA
- 129.- La glositis intersticial, señale la respuesta correcta:
- A) Aparece en la sífilis secundaria.
 - B) Se la considera una lesión precancerosa.
 - C) Son muy contagiosas.
 - D) Aparece en la sífilis primaria.

- 130.-** Señale cual afirmación de las siguientes es incorrecta:
- A) La especificidad y sensibilidad depende de la prevalencia.
 - B) El valor predictivo depende de la prevalencia.
 - C) La prevalencia es baja si el valor predictivo positivo es bajo y el valor predictivo negativo es alto.
 - D) La prevalencia es alta si el valor predictivo positivo es alto y el valor predictivo negativo es bajo.
- 131.-** En el modelo SERVQUAL, ¿Cuál de las siguientes no es una variable de opinión?
- A) Credibilidad
 - B) Comunicación
 - C) Confidencialidad
 - D) Capacidad de respuesta
- 132.-** De las siguientes enfermedades cual no tiene un origen bacteriano. Señale la respuesta correcta.
- A) TBC
 - B) Sífilis
 - C) Actinomicosis
 - D) Todas son de origen bacteriano.
- 133.-** Para analizar la dificultad quirúrgica de la exodoncia de un cordal incluido, señale la falsa:
- A) La exodoncia será más complicada a mayor distancia entre la rama ascendente y la cara distal del segundo molar.
 - B) Los cordales en posición vertical suelen presentar dificultad añadida para el acceso y la visibilidad
 - C) A mayor tamaño del espacio pericoronario y mayor anchura del ligamento periodontal, más dificultad quirúrgica.
 - D) En un paciente con osteopetrosis ofrece bajo riesgo de complicaciones.
- 134.-** Los efectos teratogénicos en el feto viene condicionados por cual de los siguientes factores:
- A) Características del fármaco y su uso en placenta.
 - B) Edad gestacional.
 - C) La vía de administración.
 - D) A y B son correctas.
- 135.-** ¿Cuál de estos no es considerado un protector dentinopulpar?
- A) Fosfato de zinc.
 - B) Ionómero de vidrio
 - C) Óxido de zinc-eugenol.
 - D) Adhesivo dentinario.
- 136.-** ¿Cuál de los siguientes signos y/o síntomas no se considera dentro del complejo relacionado con el SIDA o pre-SIDA?
- A) Sudores nocturnos/malestar /fiebre
 - B) Estreñimiento.
 - C) Infecciones crónicas
 - D) Linfadenopatías generalizadas
- 137.-** Son manifestaciones orales de la infección por VIH,excepto:
- A) Candidiasis pseudomembranosa
 - B) Periodontitis ulcerosa necrotizante.
 - C) Úlceras aftosas recidivantes.
 - D) Todas son correctas.

- 138.-** ¿Cuál es el síntoma principal de la angina de Ludwig?
- A) Sialorrea
 - B) Odinofagia
 - C) Sensación de asfixia
 - D) Disfagia
- 139.-** La probabilidad de que una prueba diagnóstica clasifique correctamente a un individuo como no-enfermo se denomina:
- A) Valor predictivo positivo
 - B) Valor predictivo negativo
 - C) Sensibilidad
 - D) Especificidad
- 140.-** Una de las siguientes contestaciones no supone, generalmente, una medida preventiva sobre enfermedades bucodentales:
- A) La asistencia esporádica al odontólogo.
 - B) La buena higiene bucodental.
 - C) La utilización de fluor tópico.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
- 141.-** Según Donabedian, entre las dimensiones de la calidad se encuentran:
- A) Equidad
 - B) Continuidad
 - C) Legitimidad
 - D) A y C son correctas
- 142.-** La causa más frecuente de exodoncia es:
- A) Caries.
 - B) Enfermedad periodontal.
 - C) Traumatismo dentario.
 - D) Ortodoncia.
- 143.-** Los espacios primates:
- A) Se producen con mucha frecuencia en la dentición temporal
 - B) Son diastemas interdentarios
 - C) En el maxilar superior se sitúan entre incisivo lateral y canino
 - D) Todas son correctas
- 144.-** La reimplantación de dientes temporales debe realizarse:
- A) De inmediato.
 - B) Nunca.
 - C) Bajo protección antibiótica
 - D) Siempre con ferulización.
- 145.-** El herpes intraoral asienta con más frecuencia en:
- A) Mucosa yugal
 - B) Lengua
 - C) Paladar duro y encía
 - D) Mucosa labial
- 146.-** Las inclusiones dentarias más frecuentes son:
- A) Terceros molares y caninos permanentes
 - B) Terceros molares y premolares superiores
 - C) Caninos permanentes y primer premolar inferior
 - D) Premolares y molares inferiores

147.- Señale cual de estas afirmaciones es incorrecta:

- A) Se recomienda el cepillado con la aparición del primer diente en la boca.
- B) A partir de los 2 años se puede empezar a utilizar la pasta dental.
- C) A partir de los 6 años se aconseja el uso de colutorios fluorados.
- D) Entre los 2 y los 6 años se recomiendan dentífricos con una concentración de flúor entre 1000 y 1500 ppm.

148.- Respecto a la anestesia troncular del nervio dentario inferior:

- A) La vía bucal es la más comunmente utilizada
- B) Representa el paradigma de las anestésicas tronculares en el ámbito estomatológico
- C) La vía cutánea debe reservarse solo ante la imposibilidad de apertura bucal adecuada o procesos inflamatorios parafaríngeos
- D) Todas son ciertas

149.- El valor predictivo positivo es:

- A) El cociente entre los verdaderos positivos y los enfermos.
- B) El cociente entre los verdaderos negativos y los no-enfermos.
- C) El cociente entre los verdaderos positivos y todos los positivos.
- D) Ninguna es cierta

150.- Al afán de hacer bien al enfermo se denomina:

- A) Principio de no - maleficencia
- B) Principio de autonomía
- C) Principio de beneficencia
- D) Principio de justicia

PREGUNTAS DE RESERVA

151.- El propósito de un estudio a doble ciego es:

- A) Obtener comparabilidad de casos y controles
- B) Evitar los efectos del placebo
- C) Reducir los efectos de la pérdida de seguimiento
- D) Evitar los sesgos del observador y del sujeto

152.- Una de las siguientes formas no constituye una forma básica de pirámide poblacional:

- A) Tipo bulbo
- B) Tipo campana
- C) Tipo herradura
- D) Tipo pagoda

153.- La forma clínica más grave del eritema multiforme se denomina:

- A) De Stevens-Johnson
- B) De Ebra
- C) De Lyell
- D) Ninguna de las anteriores

154.- A la hora de preparar una cavidad de obturación se realiza el grabado ácido con ácido ortofosfórico al:

- A) 35%.
- B) 37%.
- C) 45%.
- D) 47%.

- 155.-** El empleo de Ca (OH)₂ se basa en
- A)** Su tiempo de fraguado
 - B)** Su naturaleza alcalina
 - C)** Su facilidad de empleo
 - D)** Su rigidez
- 156.-** Las causas más frecuente de mortalidad en la edad escolar las constituyen:
- A)** Malformaciones congénitas
 - B)** Infecciones
 - C)** Procesos neoplásicos viscerales
 - D)** Accidentes
- 157.-** ¿Cuál de los siguientes factores no se considera favorable para el éxito de un recubrimiento pulpar directo con hidróxido de calcio?
- A)** Tamaño de la exposición pequeña
 - B)** Etiología traumática
 - C)** Aislamiento con dique
 - D)** Adultos y ancianos
- 158.-** El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados a:
- A)** El secreto profesional respecto a los mismos.
 - B)** El deber de guardarlos.
 - C)** Son correctas A y B.
 - D)** Ninguna es correcta.
- 159.-** No es propio de una pulpitis reversible:
- A)** Dolor provocado por estímulos
 - B)** Dolor de breve duración
 - C)** Dolor a la percusión
 - D)** Dolor fácilmente localizable
- 160.-** En el Síndrome de Ramsay-Hunt, no es cierto:
- A)** Afecta a la segunda rama del trigemino.
 - B)** Hay parálisis facial unilateral.
 - C)** Vesículas en el pabellón auditivo
 - D)** Producido por el virus del Herpes Humano tipo 3.

